

До уваги лікарів!

Пропонуємо Вам ознайомитися з висновками нового дослідження OMRIA Real-World Evidence (RWE).

У ньому було проаналізовано спостереження за **137 дорослими пацієнтами з астмою алергічної етіології** середнього і тяжкого ступеня у трьох медичних центрах Греції.

Дослідження **OMRIA RWE** продемонструвало, що включення препарату Бронхо-Ваксом до стандартної терапії (СТ) зменшило у пацієнтів кількість клінічних епізодів інфекцій дихальних шляхів (ІДШ) та пов'язаних з ними загострень астми.

60%

Зменшення клінічних епізодів ІДШ¹

71%

Зменшення загострень астми, пов'язаних з ІДШ¹


Нагадуємо, що препарат Бронхо-Ваксом показаний для запобігання рецидивуючим інфекціям дихальних шляхів. Його можна застосовувати також з метою супутньої профілактики астми під час гострої фази інфекцій дихальних шляхів у поєднанні з іншими методами лікування²

У дослідженні порівнювали ефективність лікування ІДШ за допомогою препарату Бронхо-Ваксом + СТ та застосування лише СТ.

Нижче ми наводимо короткий інформаційний бюлетень з додатковою інформацією про ІДШ та загострення астми.

Загострення астми та інфекції дихальних шляхів

Необхідність допомоги пацієнтам групи ризику



Бронхо-Ваксом

Трикомпонентна дія бактеріального лізату



* На основі доклінічних даних.

1. Christopoulou M.E., et al. J. Asthma Allergy. 2025 Jun 2;18:891–902.
2. Broncho-Vaxom® Company core data sheet (CCDS), V3 March 2023.
3. Sharma S., et al. Cureus. 2022;14(9):e28839.
4. Feddema J.J., Claassen E. Respir Med. 2020;173:106020.
5. Teichtahl H., et al. Chest. 1997;112(3):591–596.

Інформація про лікарський засіб для фахівців охорони здоров'я.

Реєстраційне посвідчення МОЗ України Бронхо-Ваксом Дорослі: UA/18521/01/01, Бронхо-Ваксом Діти: UA/18520/01/01. **Фармакотерапевтична група.** Інші засоби, що діють на респіраторну систему. Код АТХ R07A X. **Склад:** 1 капсула **Бронхо-Ваксом Дорослі** містить стандартизований ліофілізат OM-85, що містить ліофілізат бактеріальних лізатів 7 мг: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and sanguinis, Moraxella (Branhamella) catarrhalis; 1 капсула **Бронхо-Ваксом Діти** містить стандартизований ліофілізат OM-85, що містить ліофілізат бактеріальних лізатів 3,5 мг: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and sanguinis, Moraxella (Branhamella) catarrhalis.

Скорочена інструкція для медичного застосування лікарського засобу.

Показання. Попередження рецидивуючих інфекцій дихальних шляхів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та підлітки віком від 12 років: курс превентивного лікування – 1 капсулу **Бронхо-Ваксом Дорослі** приймати натще щодобово протягом 10 послідовних днів на місяць 3 місяці поспіль.

Примітка: якщо дитині важко проковтнути капсулу, то її можна відкрити та висипати її вміст у достатню кількість води, фруктового соку або молока/суміші.

Упаковка. По 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник/заявник. OM Фарма СА / OM Pharma SA, 22 рю дю Буа-дю-Лан, 1217 Мейрен, Швейцарія. За додатковою інформацією звертайтеся до Представництва «Дельта Медікел Промоушнз АГ» вул. Чорновола, 43, м. Вишневе, Київська обл., 08132. Тел.: (044) 585 00 41. DMUA. BronVax.26.01.01.

Broncho-Vaxom® є зареєстрованими торговими марками фармацевтичної компанії «OM Pharma SA», які зареєстровані у Швейцарії та інших країнах і регіонах.